

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR**Exoderil 10 mg/ml soluție cutanată**
Clorhidrat de naftifină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați Exoderil cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 14 zile.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Exoderil și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Exoderil
3. Cum să utilizați Exoderil
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Exoderil
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE EXODERIL ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Exoderil este un medicament folosit împotriva fungilor, cu utilizare la nivelul pielii.

Este recomandat în tratamentul următoarelor infecții:

- infecții micotice ale pielii sau ale pliurilor cutanate (*tinea corporis*, *tinea inghinalis*);
- infecții micotice ale piciorului, în special la nivel interdigital, la nivelul tălpii și la nivelul mâinilor;
- infecții micotice ale unghiilor (onicomicoze);
- infecții cutanate cu *Candida*;
- *Pitiriasis versicolor*.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI EXODERIL**Nu utilizați Exoderil**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la clorhidrat de naftifină sau la oricare din componentele Exoderil.

Aveți grijă deosebită când utilizați Exoderil

Exoderil conține etanol și de aceea nu trebuie să vină în contact cu ochii sau să fie aplicat pe zone ale pielii cu leziuni.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu s-au efectuat studii privind interacțiunile Exoderil.

Utilizarea Exoderil cu alimente și băuturi

Nu se cunosc interacțiuni între Exoderil și alimente sau băuturi.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări, înainte de a lua orice medicament.

Dacă este utilizat corespunzător, medicamentul nu are niciun efect asupra fătului sau asupra nou născutului.

Studiile teratologice nu au evidențiat niciun efect embriotoxic al naftifinei.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu sunt relevante.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI EXODERIL

Utilizați întotdeauna Exoderil exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Exoderil se utilizează o dată pe zi pe zona de piele afectată, după curățarea și uscarea în prealabil a acestei zone.

Pentru a preveni recurențele, tratamentul trebuie continuat 2 săptămâni după vindecarea clinică.

Exoderil este folosit numai pentru aplicații locale.

În vederea vindecării infecției fungice (micoză) cât mai curând posibil vă rugăm să luați în considerare următoarele aspecte:

1. Microbii pot adera la materialul textil realizând un contact cu aria cutanată infectată. De aceea, este necesară schimbarea zilnică a hainelor.
2. O piele normală și, în mod particular uscată, asigură o protecție bună în cazul infecțiilor fungice. Se recomandă să evitați acoperirea zonei de piele infectate cu îmbrăcăminte strâmtă sau obiecte de îmbrăcăminte care permit o ventilație limitată sau care nu permit ventilația (de exemplu ciorapi din fibre textile artificiale purtați în pantofi strâmți). De asemenea, după spălare trebuie să uscați bine zona infectată. Orice prosop sau îmbrăcăminte trebuie schimbate zilnic.
3. În cazul piciorului de atlet nu trebuie să mergeți descălțați acasă, în baie sau, de exemplu în hotel. Aceasta reprezintă calea prin care puteți preveni să fiți reinfecțat și să preveniți răspândirea ulterioară a microbilor patogeni.
4. Sauna sau băile cu aburi trebuie frecventate numai după ce infecția fungică a fost vindecată definitiv.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Exoderil

Dacă utilizați o doză mai mare de Exoderil trebuie imediat să contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Exoderil

Dacă ați uitat să aplicați soluția cutanată o dată, aplicați-o imediat ce vă amintiți. Nu aplicați o cantitate dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Exoderil

Întrerupeți tratamentul cu Exoderil doar la recomandarea medicului. În general tratamentul cu Exoderil se continuă încă două săptămâni după dispariția semnelor clinice.

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Exoderil poate provoca reacții adverse, cu toate că acestea nu apar la toate persoanele.

În cazuri izolate pot să apară: iritație locală, de exemplu uscăciune, înroșire și senzație de arsură.

Reacțiile adverse sunt total reversibile și, de regulă, nu necesită întreruperea tratamentului.

Dacă vreuna din reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PASTREAZĂ EXODERIL

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Nu utilizați Exoderil soluție cutanată după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Exoderil

- Substanța activă este clorhidrat de naftifină. 1 mg soluție cutanată conține clorhidrat de naftifină 10 mg.
- Celelalte componente sunt: propilen glicol, etanol, apă purificată.

Cum arată Exoderil și conținutul ambalajului

Exoderil se prezintă sub formă de soluție limpede, incoloră până la slab galben, cu miros caracteristic de etanol.

Medicamentul este ambalat în cutii cu un flacon din sticlă brună, prevăzut cu capac filetat din polietilenă, a 10 ml soluție.

Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul

Sandoz GmbH,

Biochemiestrasse 10, A- 6250 Kundl, Austria

Acest prospect a fost aprobat în Octombrie 2011